Karta pracy nr 82


Żaba wodna
(Pelophylax esculentus)
Ropucha zielona
(Bufotes viridis)
Ropucha szara
(Bufo bufo)
Kumak górski
(Bombina variegata)
Kumak nizinny
(Bombina bombina)
Grzebiuszka ziemna
(Pelobates fuscus)
Rzekotka drzewna
(Hyla arborea)
Żaba moczarowa
(Rana arvalis)
Żaba dalmatyńska
(Rana dalmatina)
Żaba trawna
(Rana temporaria)
Żaba jeziorkowa
(Pelophylax lessonae)
Żaba śmieszka
(Pelophylax ridibundus)
duże i małe zbiorniki wodne, tereny podmokłe, brzegi rzek nizinnych, zimuje na lądzie, sporadycznie w wodzie
takie samo, jak siedlisko
krzyżówka żaby śmieszki i żaby jeziorkowej, wszystkie trzy gatunki trudno od siebie odróżnić
3 000 - 10 000
duże zbiorniki wodne, w których też zimuje np. stawy, jeziora, nizinne rzeki
takie samo, jak siedlisko
największa żaba Karpat
2 000 - 10 000
tereny podmokłe, torfowiska, aluwia, małe środkowe i dopływowe zbiorniki wodne, zimuje na lądzie
takie samo, jak siedlisko
w okresie godowym samiec przybiera barwę optymoważtą, często zamieszkuje te same zbiorniki wspólnie z żabą wodną
1 000 - 2 000
pola uprawne ogrody, miasta, nawet z dala od wody, zimuje na lądzie
lasy, łąki, pola, ogrody, zimuje na lądzie, w górach po piętro alpejskie
5000 - 15000
płytkie, często okresowe kałuże, zbiorniki wodne, stawy ogrodowe
najlepiej przystosowana do życia w krajobrazie kulturowym najbardziej odporna na suszę, głos samca donośny
różne zbiorniki i cieki wodne
wiosną masowo migruje do miejsc rozmnażania głos samców słaby – brak rezonatorów
10 000 - 1 000
okresowe kałuże, koleiny na nieutwardzonych, leśnych drogach z dostępem do światła słonecznego
w okresie godowym podgardle samców jest bladoniebieskie
roztewiska, tereny podmokłe, okresowe kałuże, strumyki
1 000 - 2 500
wilgotne lasy, łąki, pola, zimuje na dnie strumieni, wyjątkowo w wodach stojących lub na lądzie, w górach po piętro alpejskie
600 - 2 000
duże samice mogą kąkać na odległość 15 m
trzeblatka o ciemnym charakterze i wielkości
zwykle tereny otwarte, łąki, morzeć, zimuje na lądzie, gatunek nizinny, po piętro pogórza
1 000 - 2 000
płytkie roztewiska w siedliskach naturalnych
podczas godów samiec przybiera intensywnie błękitnofioletową barwę
800 - 1 000
porcja wspinać się po pionowych ścianach, zmienia kolor swojego ciała w zależności od otoczenia, od jasnożółtego do prawie czarnego
mniejsze roztewiska, jeziorka, stawy, rowy, kałuże
1 000 - 3 500
poza okresem godowym na lądzie, głównie na lądzie, dominkie lasy liściaste, parki roślinnych, zimuje na roztewiska, zimuje na lądzie
100 - 1000
poza okresem godowym na lądzie, dalekie wędrówki, zimuje w dziurach, pod pomostami, na lądzie, gatunek nizinny
lasy, łąki, torfowiska, zimuje w dziurach, pod pomostami, na lądzie, gatunek nizinny
100 - 300
okresowe kałuże, rowy, koleiny, często w lasach głównie reglowych, zimuje na lądzie
100
głębokie stawy, zimuje na dnie, gatunek nizinny
300
głębokie stawy, zimuje na dnie, gatunek nizinny
głębokie stawy, zimuje na dnie, gatunek nizinny
głębokie stawy, zimuje na dnie, gatunek nizinny